

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP-7-6-79127928

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, EURE-ET-LOIR, INDRE, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - B.P. 210 - 45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

Téléphone : 86-36-24

Commission Paritaire de Presse n° 530 AD

ABONNEMENT ANNUEL : 60 F

M. le Sous-Régisseur de recettes
de la Protection des Végétaux

93, rue de Curambourg - B.P. 210
45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

C. C. P. : La Source 4604-25 C

BULLETIN TECHNIQUE N° 252

6 JUIN 1979

CHARANCONS ET CECIDOMYIES DES SILIQUES

/ COLZA /

De nombreuses cultures ont défleuri et le stade "10 premières siliques bosselées" est fréquemment atteint. A l'exception de quelques cultures tardives il n'y a plus lieu d'intervenir contre ces insectes.

PUCERONS NOIRS ET VERTS

/ BETTERAVES SUCRIERES /

Une surveillance des cultures est toujours indispensable. Les captures dans les pièges sont toujours importantes.

BLE TENDRE D'HIVER

/ CEREALES /

Dans la majorité des cultures, les premiers épis sont visibles et dans les plus précoces la floraison commence. Comme la semaine dernière la **FUSARIOSE** est présente à la base des tiges dans deux parcelles sur trois du réseau mais la **SEPTORIOSE A ENCORE PROGRESSE** puisqu'une parcelle sur deux présente maintenant des taches sur les trois dernières feuilles. D'après les envois des correspondants du réseau et nos observations en cultures, la situation peut être résumée actuellement dans le tableau ci-dessous :

DEPARTEMENTS & REGIONS	PRESENCE DE SEPTORIOSE SUR LES TROIS FEUILLES SUPERIEURES DANS
INDRE (Champagne Berrichonne et Boischaut Sud)	3 parcelles sur 4
CHER, EURE-ET-LOIR, (Boischaut Nord) de l'INDRE	2 parcelles sur 3
INDRE-ET-LOIRE et LOIR-ET-CHER	1 parcelle sur 2
LOIRET	1 parcelle sur 4

Les deux espèces **SEPTORIA NODORUM** et **SEPTORIA TRITICI** sont pratiquement présentes dans toutes les parcelles observées. **Septoria nodorum**, considérée comme la plus dangereuse dans le Nord de la France, est actuellement la plus fréquente. LES RISQUES DE CONTAMINATION DES EPIS SONT DONC TRES IMPORTANTS et des interventions préventives doivent être réalisées dans de très nombreuses parcelles dès que la majorité des épis seront dégagés.

Il est possible d'apprécier les risques et de décider de l'opportunité d'une intervention en examinant une cinquantaine de plantes.

* Si la deuxième et la troisième feuille en partant du sommet de la plante présentent des dessèchements en forme de losanges encadrés de jaune il convient de réaliser une intervention dès l'épiaison achevée.

* Si la quatrième ou la cinquième feuille est malade une surveillance périodique est nécessaire mais un traitement ne se justifie pas dans l'immédiat.

Les rouilles et l'oïdium étant assez rares, il convient de préférer, pour lutter contre les maladies de l'épi, les associations de BENZIMIDAZOLES (Carbendazime, Benomyl, Thiophanate Methyl) avec du MANEBE, du MANCOZEBE ou du CAPTAFOL.

Les pucerons étant toujours rares, il ne convient PAS D'ADJOINDRE au fongicide UN INSECTICIDE A L'EXCEPTION DES SITUATIONS où DES CECIDOMYIES sont observées. Le seuil d'intervention contre les cécidomyies a été atteint dans plusieurs postes de piégeage du département de l'Indre la semaine dernière. Des captures ont également été notées dans les départements du Cher, de l'Eure-et-Loir et de Loir-et-Cher. Il convient d'être très vigilant. Pour toute précision complémentaire il est possible de se reporter au Bulletin technique du 29 Mai.

ORGES D'HIVER ET DE PRINTEMPS

A l'exception de cultures très tardives d'orges d'hiver actuellement au stade gonflement il est trop tard pour intervenir contre la rhynchosporiose. Sur orges de printemps les interventions les plus efficaces doivent être réalisées début montaison. Les conditions climatiques actuelles sont beaucoup moins favorables au développement de la rhynchosporiose.

BLES DURS

Un développement de la septoriose est aussi constaté sur blés durs. Comme pour les blés tendres des interventions préventives pour protéger les épis sont, dans certaines cultures, indispensables.

REPONDEURS TELEPHONIQUES

En raison d'une panne le répondeur téléphonique de FLEURY-les-AUBRAIS (38) - 61 . 00 . 74 n'a pu fonctionner pendant trois jours. La durée du message enregistré est par obligation actuellement inférieure à la minute. Le message actuel ne contient donc que les informations essentielles.

/ 'Ingénieur en Chef d'Agronomie,

Chef de la Circonscription Phytosanitaire "CENTRE"

G. B E N A S